La **vaccination** contre le **HPV**

Fiche informative destinée aux médecins généralistes

Promo Santé & MG asbl

Bénéfices potentiels de la vaccination

L'infection par HPV reste l'IST la plus répandue. On estime que 80% de la population est porteur du virus au cours de la vie.

Le HPV est responsable de presque 100% des cas de cancer du col utérin chez la femme (majoritairement les sous-types 16 et 18), ainsi que d'autres cancers, y compris chez les hommes (anogénitaux et ORL). Le HPV est également responsable de l'apparition de verrues génitales (surtout les sous-types 6 et 11).

La vaccination contre le HPV offrirait une protection de l'ordre de 90 % contre les verrues pour les vaccins nonavalent (Gardasil 9®) et de l'ordre de 45 à 90 % de protection contre le cancer du col de l'utérus en fonction du statut HPV avant vaccination.

Public cible pour la vaccination

- Vaccination généralisée des adolescent·es de 9 à 14 ans inclus : 2 doses
- Rattrapage des jeunes hommes et femmes de 15 à 26 ans[1]: 3 doses
- Patient·es immuno-déprimé·es (VIH et transplanté·es) : 3 doses

Modalités de vaccination

Administration intramusculaire :

- De 9 à 14 ans : schéma en 2 doses (0 - 5 - 13 mois)
- À partir de 15 ans : schéma en 3 doses (0 - 2 - 6 mois)
- Pour les patient·es immunodéprimé·es : schéma en 3 doses de préférence avec le nonavalent. En cas de transplantation, la dernière dose 2 semaines avant l'intervention.

[1] Le risque d'infection et de lésions dysplasiques et cancéreuses étant particulièrement accru chez les HSH, le rattrapage devrait être proposé jusque 26 ans inclus dans ce groupe.

Contre-indications à la vaccination

- L'administration de ce vaccin n'est pas recommandée pendant la grossesse. Les femmes allaitantes peuvent recevoir ce vaccin.
- En cas de maladie aiguë non contrôlée.
- Si antécédent d'allergie à un composant du vaccin.

Effets indésirables potentiels

- Rougeur, rash, démangeaisons au site d'injection (très fréquent)
- Céphalées (15 % dans les 15 jours suivants)
- Urticaire et bronchospasme-choc anaphylactique (très rare)

Prix et modalités de remboursement

CERVARIX (HPV 16, 18) vaccin recombinant : 69,58 €

Schéma complet remboursé de 9 à 18 ans pour les femmes, indiquer la mention « dose N° » sur l'ordonnance pour bénéficier du tiers payant à la délivrance en pharmacie.

GARDASIL 9® vaccin recombinant : 135,40 €.

Actuellement dans le programme de vaccination FWB.

Schéma complet remboursé de 9 à 18 ans pour les femmes.

Schéma complet remboursé de 9 à 15 ans pour les hommes.

Références

1 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Conseil supérieur d'Hygiène. Vaccination contre les infections causées par le papillomavirus humain. Bruxelles ; juillet 2017, CSS 9181.

2 Vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) : gratuite également pour les garçons à partir du 1er septembre 2019, folia juillet 2019 : www.cbip.be/fr/articles/query?number=F46F07B

3 infection à papillomavirus humain : www.vaccination-info.be/maladie/infections-a-papillomavirus-humains-hpv/

4 vaccin papillomavirus à 9 valences : un progrès ignoré ?- La revue Prescrire. Juin 2019.tome 39 n° 428 .

8 rue de Suisse, 1060 Bruxelles +32 (0)2 218 85 95 info@promosante.be www.promosante.be

Rédigé par la cellule Vaccination de la SSMG, janvier 2022

Validé et adapté par : le comité de lecture de Promo Santé et Médecine